

L'ACL est un activateur d'appétence, de digestion et de production.

Il est riche en Energie Hautement Assimilable et en Azote pour stimuler la flore ruminale et contient un prémix oligo-vitaminique.

Pour une conservation et une utilisation optimales, l'ACL contient des agents de stabilisation et d'homogénéisation.

L'ACL 30 se distribue sur des rations bien pourvues en énergie et en azote. Il convient aux troupeaux bovins en ration ensilage de maïs ou ensilage d'herbe.

CARACTERISTIQUES

EHA (Energie Hautement Assimilable) : mélasse de canne, soluble de pomme de terre, glycérine.

Azote : solubles de fermentation, soluble de chicorée, soluble de pomme de terre, urée.

Noyau d'épices et huiles essentielles : cocktail d'huiles essentielles.

AVANTAGES

L'apport simultané d'énergie et d'azote stimule la flore ruminale. Le noyau d'épices et huiles essentielles augmente la salivation pour favoriser la synthèse de facteurs tampons naturels et limiter les risques d'acidose. Ce noyau stimule également la flore cellulolytique et fongique pour valoriser la fibre des fourrages.

La ration est mieux digérée et mieux valorisée pour une meilleure efficacité alimentaire.

La bonne valorisation de la ration permet d'augmenter la production de lait et de viande. Les génisses ont une bonne croissance.

Le troupeau est en bonne santé et la fécondité est améliorée.

GARANTIES ANALYTIQUES

Humidité :	40 %	Protéines brutes :	30 %
Cendres brutes* :	9 %	EHA :	17 %
Sucre :	10-15 %	Phosphore* :	0.1 %
Calcium* :	0.2 %	Magnésium* :	0.2 %
Sodium* :	1 %	Potassium* :	3 %
Soufre* :	0.5 %	BACA* :	420 mEq/kg
Vitamine A :	15 000 UI/kg	Vitamine D3 :	6 000 UI/kg
Vitamine E :	15 mg/kg	Zinc :	300 mg/kg
Manganèse :	300 mg/kg	Iode :	5 mg/kg
Cobalt :	0.5 mg/kg	Sélénium :	0.5 mg/kg
Urée :	4 %	Densité* :	1.27

Cet aliment ne contient pas de cuivre ajouté.

* Possibilité de fluctuation de ces valeurs.

MODE D'EMPLOI

L'ACL se distribue en plus de tout le reste de la ration

- ⇒ Sur vaches laitières : Distribuer 500 g le 1^{er} jour et passer progressivement à 1 kg à 1.2 kg en une semaine, en vérifiant bien que les animaux pourront manger plus de fourrage (+ 1 kg de MS ingérée).
- ⇒ Sur taurillons : distribuer 500 à 800 g/jour suivant indice.
- ⇒ Sur brebis et chèvres : 10 à 15 % de MS de la ration.

ACL 30
Aout 2012